

## Pražskou zelení ke hvězdám z pohledu netopýrů

Z pohledu netopýrů lze trasu pochodu rozdělit do tří částí, v nichž jsme prováděli průzkum netopýrů: Stromovka, ulice Bubenče a Letenské sady.

**Stromovka** je jednou z nejvýznamnějších „netopýřích“ lokalit v Praze. Svojí polohou v blízkosti Vltavy v kombinaci se starými stromy prostřídányi travnatými porosty a s množstvím menších vodních ploch se blíží ideálnímu stanovišti pro netopýry. Řeka Vltava je významným krajinným prvkem, pro netopýry má podobný význam jako pro lidi dálnice. Podle ní se orientují při svých migracích. Rybníčky jsou líhni mnoha druhů hmyzu a poskytují netopýrům bohatý zdroj potravy. Kromě přirozených úkrytů v dutinách stromů mají netopýři k dispozici netopýří budky.

Při dřívějším detektoringu (v roce 2007) bylo ve Stromovce zjištěno 6 druhů - n. velký (*Myotis myotis*), n. řasnatý (*M. nattereri*), n. vodní (*M. daubentonii*), n. nejmenší (*Pipistrellus pygmaeus*), n. parkový (*P. nathusii*), n. rezavý (*Nyctalus noctula*). Z pokácených stromů bylo zachráněno několik kolonií netopýrů rezavých. Byl zde potvrzen první zimní nález kolonie netopýra parkového v Praze. I přes rozsáhlé kácení stromů poškozených při povodních v roce 2002 e Stromovka vyhledávaným stanovištěm a lovištěm netopýrů.

Netopýři vyhledávají úkryty také v okolní zástavbě, **v ulicích Bubenče**, v různých škvírách na fasádách budov a dokonce i v plynových topidlech, tzv. vafkách (Bubenečská, Eliášova, Puškinovo nám. aj.).

V blízkosti Vltavy se nacházejí **Letenské sady**. Výskyt netopýrů ve srovnání se Stromovkou je výrazně menší, zaznamenali jsme zde v roce 2017 čtyři druhy. Nejpočetnější byl netopýr rezavý (*Nyctalus noctula*) a netopýr parkový (*Pipistrellus nathusii*). Dále se tu vyskytoval n. večerní (*Eptesicus serotinus*) a n. nejmenší (*P. pipistrellus*).

Ve Stromovce bylo při průzkumu v roce 2018 zjištěno pomocí ultrazvukového detektoru 9 druhů netopýrů:

- n. rezavý** (*Nyctalus noctula*),
- n. nejmenší** (*Pipistrellus pygmaeus*),
- n. parkový** (*P. nathusii*),
- n. večerní** (*Eptesicus serotinus*),
- n. vodní** (*Myotis daubentonii*),
- n. vousatý/brandtův** (*Myotis mystacinus/brandtii*),
- n. řasnatý** (*M. nattereri*),
- n. velký** (*M. myotis*),
- n. ušatý/dlouhouchý** (*Plecotus auritus/austriacus*).

